

UGONJWA WA TAIFODI (TYPHOID) NA PULORAMU (PULLORUM DISEASE)

KWA KUKU

Na Augustino Chengula

Haya ni magonjwa mawili tofauti yanayoshamulia kuku yenze kufanana kwa asilimia kubwa sana. Magonjwa yote yanababishwa na bacteria aina ya *Salmonella* wakitofautiana kidogo wadudu wake. Wakati Taifodi ya kuku ikiwa inasababishwa na *Salmonella gallinarum* wakati ule wa pullorumukiwa unababishwa na wadudu wajulikanao kitaalamu kama *Salmonella pullorum*. Magonjwa yote haya mawili yanababisha kushuka kwa uzalishaji wa kuku na kufanya wafugaji kupata hasara kubwa sana hasa kwa kuku wa kisasa (nyama na mayai). Kwa kawaida kuku ndio wanaoathirika zaidi na magonjwa haya, lakini ndege wengine pia hupata kama bata, njiwa, kanga na mbuni. Maambukizi yake ni asilimia 10 hadi 80 hivi na vifo huongezeka kutegemea na kushuka kwa kinga ya kuku hadi kufikia asilimia 100. Vifaranga wanaweza kufa mapema mara baada ya kuanguliwa bila kuonyesha dalili yeyote ile. Mlipuko mkali hutokea kuku wakiwa bado chini ya umri wa wiki tatu ambapo vifo vinaweza kufikia asilimia 90 kama matibabu hayajafanyika kwa wakati. Wanaosalimika huwa wamedhoofika sana na wenyewe sura isiyovutia.

Uenezwaji

Njia kuu ya uenezaji ya moja kwa moja kwa magonjwa haya ni kupitia mayai, lakini njia nyingine ni;

- Kuku-kuku: hapa kuku mmoja hueneza ugonjwa kwa mwingine kwa kugusana
- Kuku-mayai-vifaranga: hapa kuku aliyepona ugonjwa huambukiza mayai ambapo yakianguliwa huupeleka ugonjwa kwa vifaranga kwa theruthi moja
- Vifaranga-vifaranga: ugonjwa unaenea kwa njia ya kugusana kwenye kiangulia

mayai (inkubeta), kwenye box wakati wa kusafirisha na sehemu wanapolala.

-Kuku kudonoa mizoga ya kuku wenye ugonjwa hasa waliotupwa ovyo, pia panya,

mbwa na paka wanaweza kubeba mizoga na kupeleka kwenye shamba jingine

-Maambukizi kupitia kuku wenye vidonda

-Kwa njia ya chakula, maji na malalia yaliyochafuliwa na kinyesi cha kuku wenye wadudu wa ugonjwa

-Pia kuku wanaweza kupata ugonjwa kutoka kwenye mikono,miguu, nguo, viatu kutoka kwa wanaohudumia kuku/wageni au vifaa vyenye wadudu nya kulishia kuku,nya maji.

-Banda lilotumika awali kama lilikuwa na ugonjwa na halikusafishwa vizuri

NB: Watakaosalimika na ugonjwa wanakuwa wasambazaji wa ugonjwa kwa uzazi ujao kwani kuku hawa huwa na afya njema wakiwa na wadudu mwilini mwao.

Bakteria wa ugonjwa humpata kuku kwa njia ya hewa (mfumo wa upumuaji) au kwa njia ya mfumo wa chakula.

Dalili za magonjwa haya:

-Kukosa hamu ya kula

-Huwa na kiu ya maji

-Kunyong'onyea

-Kuku huinama muda mwingi wakiwa kama na usingizi, macho yamefumba

-Manyoa yaliyotimutimu (yalikaa hovyhovyo)

-Hutoa mlion kwa sauti

-Kuku hupumua kwa shida

-Kushindwa kutembea

-Huonekana kama wameshikwa na baridi na kujikusanya sehemu yenyeye joto/moto

-Muharo mweupe

-Maeneo ya nyuma kuzunguka sehemu ya kutolea kinyesi huwa na mbandiko wa kinyesi

-Huwa wadhaifu na ukuaji wao hudorola

-Hufa

Wakipasuliwa

-Kuwepo kwa vijiuvimbe (vinundu) kwenye mapafu, ini, ukuta wa firigisi na kwenye Moyo

-Kuvimba kwa utumbo, bandama, ini, figo, mapafu yanayoweza kuwa yameja damu

Utambuzi wa ugonjwa

Utambuzi unaweza kufanya kwa kutumia dalili zilizotajwa hapo juu hasa na mfugaji, lakini ili kujilidhisha kwa uwepo wa ugonjwa huu ndani ya shamba lako kabla hujachukua hatua ni vema ukatumia vipimo vyta kimaabara. huko wataotesha wadudu ili waweze kuwatambua na kuthibitisha uwepo magonjwa hayo.

Matibabu

-Magonjwa haya hutibika kwa kutumia mbambali yanayoua bakteria kama Amoksilini na Tetrasaiklini yanayopunguza vifo na uenezaji. Lakini hakuna matibabu yanayoweza kuzuia kuku wasambazaji wa ugonjwa ambao huwa wamepona.

Uzuiaji wa magonjwa haya

-Kwanza unatakiwa uanze maeneo yale wanakozalisha vifaranga, ambapo ikitokea magonjwa haya yameingia maeneo hayo basi kuku wote wanapaswa kuondolewa na kuanza upya. Banda lake lisafishwe vizuri na kupulizia madawa. Hii ni kwasababu kuku wote wanaopona wataendelea kusambaza ugonjwa kwenye mayai na vifaranga vitakavyo zaliwa. Hivyo mashamba yanayozalisha vifaranga lazima yafanye uchunguzi wa mara kwa mara kuhakikisha mashamba yao hayana

magonjwa haya.

-Nunua vifaranga au kuku kutoka katika mashamba ambayo yameidhinishwa na serikali kufanya kazi hiyo na ambayo hayana historia ya magonjwa haya.

-Kama unanunua mayai kwa ajili ya uanguaji, hakikisha yanatoka kwenye mashamba yasiyo na ugonjwa

-Shamba lako likipata magonjwa haya (kwa kuthibitishwa na maabara) ni vema ukaondoa kuku wote na kuanza upya ufugaji kwani hata ukitibu watakaopona wataendelea kuusambaza ugonjwa kwa kuku wengiene. Hii ndo njia pekee ya kuuondoa ugonjwa na ndo chaguo zuri.

-Kabla hujaanza ufugaji wa kuku wengine kwa kutumia banda hilohilo, ni vema ukalisafisha vizuri, fukizia dawa na kisha liache kwa muda usiopungua mwezi mmoja ndipo ulete kuku wengine.